

ZIEMNIAK

PLOCHER®



PLOCHER witalny plan: ZIEMNIAK

Fazy rozwojowe	Po zbiorach i na wiosnę	Sadzenie	21 - 25 Tworzenie liści i todyg 31 - 39 Wzrost części nadziemnych	41 - 49 Zwarcie międzyrzędzi 51 - 59 Początek kwitnienia	61 - 69 Pełnia kwitnienia 70 - 79 Tworzenie jagód
Produkty-PLOCHER Zalecenia do aplikacji Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l/ha. Wymieszać w wiadrze z wodą. W przypadku tworzenia mieszanek, wlać produkty PLOCHER zawsze jako pierwsze do opryskiwacza polowego z uruchomionym mieszadłem cieczy.	plocher humus gleba (me) (ak 7071) 1-2/l/ha Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha	plocher rośliny (do) (ap 3051) lub plocher rośliny (me) (ap 3071) 500 g lub ml/ha	plocher humus gleba (me) (ak 7071) 500 ml/ha plocher specjalny-liść (me) (ap 3471) 100 ml/ha plocher rośliny (do) (ap 3051) 100 g/ha	plocher kombi-liść (sm) (ap 3752) 500 g/h plocher specjalny-liść (me) (ap 3471) 200 ml/ha plocher rośliny (do) (ap 3051) 100 g/ha	plocher kombi-liść (sm) (ap 3752) 500 g/ha plocher rośliny (do) (ap 3051) 100 g/ha
Koszty od /ha € netto	€ 45,38 – 90,76	€ 16,73/18,90	€ 22,69 + 3,78 + 3,36	€ 22,70 + 7,56 + 3,36	€ 22,70 + 3,36
* Uwagi, informacje: Warunki pogodowe i lokalizacja mogą spowodować zmiany w kolejności, częstotliwości oraz dawkowaniu oprysków. ZWRÓĆ UWAGĘ NA PLOCHER ZALECENIA – STR. 20	Kompostowanie powierzchniowe resztek pożniwnych lub poplonów / międzyplonów. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu, w czasie jej tankowania) bezpośrednio przed aplikacją na pole.	Zaprawa sadzeniaków: na sucho (do) lub jako oprysk (me)	Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu, jako optymalnego nawozu dolistnego o fungicydowym działaniu)	* W zależności od rozwoju i problemów zastosować ponownie: plocher kombi-liść (sm) 400 - 600 g/ha * W razie konieczności oprysk powtórzyć	* W zależności od rozwoju i problemów: plocher kombi-liść (sm) 400 - 600 g/ha